

L'Orchidarium de Prangins vous propose une large gamme d'orchidées exotiques originales.

Sélectionnées avec passion, profitez dès aujourd'hui de leur magnifique floraison. Dans un environnement adéquat et selon vos bons soins, ces êtres vivants seront prospères et refloweront.

Angraecum

MADAGASCAR MASCAREIGNES AFRIQUE de l'EST

| moyen | floraison 3-4 semaines | intérieur lumineux | 18-25°C | arrosage 1x/sem

Emplacement

Derrière une fenêtre lumineuse exposition est, sud ou ouest.

Température idéale 18-25°C.

Eviter les courants d'air et les zones sombres. Apprécie un peu de soleil direct après acclimatation.

Les espèces à feuillage fin requièrent un environnement moins lumineux et plus humide (ex: Angraecum germynianum).

Arrosage

Modéré, une fois par semaine.

Utiliser une eau tempérée si possible sans calcaire (Volvic, eau de pluie, filtre Brita ou eau de renouvellement de votre aquarium d'eau douce).

Ne jamais laisser la plante les pieds dans l'eau. Laisser sécher le substrat entre chaque arrosage.

Engrais toute l'année un arrosage sur deux avec l'engrais ORKIS.

Vaporer régulièrement de l'eau sur les racines aériennes.

Après la floraison

- 1 Couper la tige à la base, entre les feuilles lorsque les fleurs sont tombées.
- 2 **Continuer les mêmes soins régulièrement.** La croissance de la plante va se poursuivre. Les Angraecum sont des orchidées qui poussent très lentement.
- 3 **En été, les Angraecum apprécient un séjour au jardin de mai à septembre en les plaçant à mi-ombre avec du soleil le matin. Continuer les arrosages régulièrement toute la saison et donner de l'engrais.**
- 4 Faire attention que l'eau ne stagne pas entre les feuilles car ceci peut entraîner la pourriture du cœur de la plante.
- 5 La floraison des Angraecum intervient toute l'année selon les espèces.
- 6 Le rempotage s'effectue en général au printemps avec notre substrat pour orchidée. Veillez à ne pas utiliser de pots trop gros et ne pas trop arroser les plantes pendant les 3 mois qui suivent le rempotage. **Cette opération ne s'effectue que tous les 3 à 5 ans car les Angraecum n'aiment pas être dérangés.**

En cours de culture peut survenir...

Cochenille farineuses : insecte blanc cotonneux sur tiges et feuilles. S'élimine avec Actara G ou Aerofleurs Spray.

Cochenille à bouclier : pustule brune sur tiges et feuilles. S'élimine avec Actara G ou Aerofleurs Spray.

Acariens : ponctuations grisâtres sous les feuilles et sur les hampes florales causées par la présence d'araignées rouges. Traiter avec Spomyl et augmenter l'humidité ambiante par vaporisation d'eau sur le feuillage.

Jaunissement des feuilles et chute : si les feuilles jaunissent de la base vers l'extrémité une après l'autre, traiter d'urgence avec un fongicide systémique (Aliette, Carbendazime ou fongicide GESAL prêt à l'emploi) pour stopper l'infection. Placer la plante dans un environnement plus sec et stopper la brumisation du feuillage.

Pourriture des racines : peut être provoquée par des arrosages trop fréquents et/ou un substrat décomposé ou trop fin. Rempoter la plante de suite dans un substrat sain en utilisant un pot de plus petit diamètre.

Absence de fleurs : souvent dû à un emplacement de culture trop sombre. Nombre d'espèces d'Angraecum apprécie la lumière vive.

Lorsque la plante se trouve dans un environnement inadéquat et/ou reçoit des soins inappropriés, la floraison peut être abrégée, les feuilles peuvent jaunir et l'orchidée dépérir.

Vous trouverez plus d'information sur www.orchidarium.ch